

معلومات حول لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة

5 مارس 2021

إن لقاحات كوفيد-19 آمنة. ولكن هناك بعض الأشخاص الذين ينبغي لهم التحدث مع مقدمي الرعاية الصحية قبل أن يحصلوا على اللقاح. إذا كنت تحصل على هذه المعلومات، فذلك لأننا نعتقد أنك قد تستفيد من التحدث بقدر أكبر مع مقدم الرعاية الصحية قبل حصولك على اللقاح، على سبيل الاطمئنان فقط.

إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى من رد فعل تحسسي (مثل التأق) لأي شيء في الماضي أو إذا عانيت من أي رد فعل تحسسي بعد وقت قصير من تلقي لقاح آخر أو علاج دوائي قابل للحقن (بما في ذلك الحقن في الوريد أو العضلة أو تحت الجلد)، ينبغي عليك التحدث مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك عن تاريخ إصابتك بالحساسية حتى يتمكنوا من المساعدة في تحديد إذا ما كان من الآمن إعطاؤك لقاح كوفيد-19، أو إذا كان هناك لقاح معين أكثر ملاءمة لك. ويمكن أن تشمل ردود الفعل التحسسية الخطيرة أعراضًا مهددة للحياة مثل تورم الوجه أو الفم أو الحلق؛ والأزيز أو صعوبة التنفس؛ وفقدان ضغط الدم المفاجئ؛ وغير ذلك من الأعراض الخطيرة التي تستلزم عادةً إعطاء الشخص المصاب إيبينفرين (مثل قلم حقن الإبينفرين) وإحالته إلى المستشفى. قد يسبب أي دواء أو لقاح الإصابة برد فعل تحسسي، وتوصلت الدراسات التي بحثت في مدى سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19 الجديدة إلى أن ردود الفعل التحسسية الخطيرة كانت نادرة للغاية. لكن الحساسية تجاه بعض المواد قد تعرضك لخطر متزايد لرد فعل تحسسي تجاه أحد لقاحات كوفيد-19. وبالتالي، يوصى بأن تتحدث مع مقدم الرعاية الأولية عن تاريخ إصابتك بالحساسية ليفهم بشكل أفضل ظروف ردود الفعل التحسسية السابقة، وإذا ما كنت قد تحتاج إلى تقييم طبي إضافي لمعرفة سبب ردود الفعل التحسسية السابقة قبل أن تتلقى لقاح كوفيد-19. بعد المناقشة مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك، إذا كان من المناسب لك تلقي لقاح كوفيد-19 (أو إذا اخترت تلقي اللقاح)، فسنقوم بإعطائه لك، ولكن عندئذ سنراقبك لمدة 30 دقيقة بعدها للتأكد من عدم وجود رد فعل فوري تجاه اللقاح.

إذا كان جهازك المناعي ضعيفًا بشدة (على سبيل المثال، بسبب العلاج الكيميائي أو زرع عضو أو أي حالة طبية أخرى تجعل جهازك المناعي لا يعمل بصورة سليمة)، فينبغي عليك التحدث عن المخاطر والفوائد المحتملة للقاح كوفيد-19 مع مقدم الرعاية الصحية الذي يشرف على حالتك المناعية. لا يزال بإمكانك تلقي لقاح كوفيد-19 لأننا لا نتوقع وجود مشكلة تتعلق بالسلامة عند تلقيك أحد اللقاحات. إلا أننا لا نملك حتى الآن الكثير من المعلومات عن مدى سلامة وفعالية اللقاحات في الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهازهم المناعي.

إذا تلقيت لقاح كوفيد-19، فقد لا يعمل كما ينبغي نظرًا لأن جهازك المناعي قد لا يكون قادرًا على تكوين استجابة مناعية قوية له أو إنتاج الأجسام المضادة اللازمة لحمايتك بشكل كامل. وبالتالي ستحتاج إلى الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية نفسك من كوفيد-19 حتى بعد تلقي اللقاح.

إذا كنت حاملاً في الوقت الحالي، فنحن نطلب منك التحدث عن مخاطر اللقاح وفوائده مع مقدم الخدمات المتعلقة بالحمل الخاص بك. لم تخضع لقاحات كوفيد-19 الجديدة للدراسة بشكل مكثف لدى النساء الحوامل، لذلك ليس لدينا الكثير من المعلومات حول سلامتها وفعاليتها أثناء الحمل. ومع ذلك، نظرًا لأن لقاحات كوفيد-19 لا تحتوي على فيروسات حية، فإننا نعتقد أن خطر اللقاحات عليك وعلى جنينك منخفض. نعلم أيضًا أن الإصابة الفعلية بفيروس كورونا المستجد أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بمرض شديد قد يؤدي إلى دخول المستشفى ويزيد من خطر حدوث نتيجة سيئة للحمل، مثل الولادة المبكرة. لذلك، نحن نعتقد أن النساء الحوامل سيستفدن من الحصول على لقاح كوفيد-19 ولكننا نطلب منك مناقشة هذا الأمر مع مقدم الخدمات المتعلقة بالحمل الخاص بك الذي يعرفك أنت وطفلك على أفضل وجه. يتوفر أيضًا المزيد من المعلومات من على موقع CDC: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html>

بعد مناقشة أي من الحالات المذكورة أعلاه مع مقدم الرعاية الصحية، سيسعدنا أن نحدد موعدًا لك لتلقي أحد لقاحات كوفيد-19 إذا وافقت أنت ومقدم الرعاية الخاص بك على التطعيم. إننا نرغب فقط في التأكد من إتاحة الفرصة لك لمناقشة لقاح كوفيد-19 مع مقدم الرعاية الصحية الموثوق لديك وقدرتك على اتخاذ القرار الصحيح والمناسب لصحتك.